

# Braunoderm®

## Gebrauchsfertiges Hautdesinfektionsmittel

### EIGENSCHAFTEN

- Alkoholische Povidon-Iod-Lösung
- Zur Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen und Punktionen
- Schnelle desinfizierende Wirkung schon ab 15 Sekunden
- Lang anhaltende Wirkung durch Alkohol und PVP-Iod
- Gute Kennzeichnung des desinfizierten Hautareals
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze; inaktiviert viele Viren, z.B. Vaccinia- und Polioviren
- Als Sprechstundenbedarf abrechenbar

### DGHM-/VAH-gelistet

### WIRKSPEKTRUM/EINWIRKZEITEN (EZ)

EINSATZGEBIET	EZ
<b>bei talgdrüsenarmer Haut*</b> vor Injektionen und Punktionen vor Gelenkpunktionen, Körperhöhlen sowie vor Operationen	mind. 15 Sek. mind. 60 Sek.
<b>bei talgdrüsenreicher Haut*</b> vor allen Eingriffen die Haut ständig feucht halten	mind. 10 Min.
<b>Viruswirksamkeit (in vitro)</b>	
HCV	30 Sek.
Vacciniaviren	30 Sek.
Polioviren	2 Min.

\* nach DGHM-/VAH-Richtlinien

### INDIKATIONEN

Zur Hautdesinfektion vor:

- Injektionen und Punktionen (z. B. Blutentnahmen, Impfungen)
- Operativen Eingriffen
- Katheterisierungen

langanhaltend wirksam



### HINWEISE ZUR ANWENDUNG UND DOSIERUNG

Braunoderm® unverdünnt auftragen und zu behandelnde Hautpartien vollständig benetzen. Während der vorgeschriebenen Einwirkungszeit feucht halten. Nach der Einwirkungszeit trocknen lassen. Bei der präoperativen Hautdesinfektion „Pfützenbildung“ unter dem Patienten wegen möglicher Hautreizungen vermeiden. Vor Anwendung elektrischer Geräte muss das Präparat auf der Haut vollständig abgetrocknet sein.

LIEFERFORM	VE	Art.-Nr.	PZN
<b>Braunoderm®</b>			
250 ml-Sprühflasche	20	3881105	08505165
1000 ml-Varioflasche	10	3881156	02181974
5 Liter-Kanister	1	6504264	03036748
<b>Braunoderm® nachgefärbt</b>			
1000 ml-Varioflasche	10	3881059	01867557
5 Liter-Kanister	1	6504256	03036731
Handsprühkopf für 1000 ml-Flasche	1	3908012	02744265

#### Braunoderm®/Braunoderm® nachgefärbt

**Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten:** Wirkstoffe: 2-Propanol (Ph. Eur.) 50,0 g, Povidon-Iod mit 10 % verfügbarem Iod (mittleres Molekulargewicht von Povidon etwa 40.000) 1,0 g **Sonstige Bestandteile:** gereinigtes Wasser, Kaliumiodid (0,4 g, Stabilisator), Natriumdihydrogenphosphat (Braunoderm® nachgefärbt zusätzlich: Farbstoffe E 110, E 124, E 151). **Anwendungsgebiete:** Zur Desinfektion der Haut vor operativen Eingriffen, Injektionen, Punktionen, Katheterisierungen, Blutentnahmen, Impfungen. **Gegenanzeigen:** Hyperthyreose oder eine andere manifeste Schilddrüsenerkrankung, Dermatitis herpetiformis Duhring, Planung oder Durchführung einer Radioiodtherapie (bis zum Abschluss der Behandlung), Überempfindlichkeit gegenüber Iod, 2-Propanol oder einem anderen Bestandteil des Arzneimittels. **Warnhinweise:** Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 21–22 °C Flammpunkt nach DIN 51755. **Nebenwirkungen:** Sehr selten: Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut, z. B. kontaktallergische Reaktionen vom Spättyp, die sich in Form von Jucken, Rötung, Bläschen o. ä. äußern können. Sehr selten: akute Reaktionen des Immunsystems (anaphylaktische Reaktionen) unter Beteiligung anderer Organe (z. B. Haut, Atemwege, Kreislauf). Gelegentlich: lokale, alkoholbedingte Austrocknungs- und Reizerscheinungen der Haut (Rötung, Spannung, Juckreiz). **Stand der Information:** 05/2011 **Pharmazeutischer Unternehmer:** B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (0 56 61) 9147-70 00

E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de

Betriebsstätte: Melsungen | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen